

# Оксалиплатин «ЭБЕВЕ»

## Новый стандарт терапии

- рака толстого кишечника
- метастатического колоректального рака



Флаконы по 50 мг и 100 мг



**EBEWE ОНКОЛОГИЯ**  
многосторонний подход

# Оксалиплатин «ЭБЕВЕ»

## Схемы назначения при терапии рака толстого кишечника и метастатического колоректального рака<sup>1-7</sup>

Режимы химиотерапии	Оксалиплатин	5-фторурацил в сочетании с кальциумфолинатом или без него
AIO	85 мг/м <sup>2</sup> каждые 2 недели	ФУ: 2,6 г/м <sup>2</sup> в виде 24 часовой инфузии КФ: 500 мг/м <sup>2</sup> в виде 24 часовой инфузии Каждые 2 недели
de Gramont	85 мг/м <sup>2</sup> каждые 2 недели	ФУ: 1,5 г/м <sup>2</sup> в виде 22 часовой инфузии КФ: 500 мг/м <sup>2</sup> в виде 2 часовой инфузии Каждые 2 недели в 1–2 й дни
TTD	85 мг/м <sup>2</sup> каждые 2 недели	ФУ: 2,25 г/м <sup>2</sup> в виде 48 часовой инфузии
FOLFOX 4	85 мг/м <sup>2</sup> каждые 2 недели	ФУ: 400 мг/м <sup>2</sup> болюс струйно, затем 600 мг/м <sup>2</sup> в виде 22 часовой инфузии КФ: 200 мг/м <sup>2</sup> Каждые 2 недели в 1 2 й дни
FOLFOX 6	85 мг/м <sup>2</sup> каждые 2 недели	ФУ: 400 мг/м <sup>2</sup> болюс струйно, затем 2,4 г/м <sup>2</sup> в виде 46 часовой инфузии КФ: 400 мг/м <sup>2</sup> в виде 2 часовой инфузии в 1 й день
FOLFOX 7	85 мг/м <sup>2</sup> каждые 2 недели	ФУ: 2,4 г/м <sup>2</sup> в виде 46 часовой инфузии КФ: 400 мг/м <sup>2</sup> в виде 2 часовой инфузии Каждые 2 недели в 1 день

**Примечание:** ФУ – 5-фторурацил; КФ – кальциумфолинат  
во всех случаях кальциумфолинат вводили до 5-фторурацила

# Оксалиплатин «ЭБЕВЕ»


- Оксалиплатин – производное платины третьего поколения
- Имеет доказанную эффективность при лечении платинорезистентных опухолей
- Проявляет высокую эффективность при лечении опухолей толстого кишечника, в том числе метастазирующих, и колоректального рака
- Результаты последних исследований свидетельствуют о значительной эффективности при лечении рака яичника, неходжкинской лимфомы, НМКРЛ, рака желудка, рака мочевого пузыря, рака головы и шеи, рака молочной железы<sup>8-11</sup>
- Проявляет выраженный синергизм при совместном использовании с другими препаратами платины и 5-фторурацилом
- Оксалиплатин имеет низкую гематотоксичность, нефротоксичность и ототоксичность

1. Tournigand C et al. FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer: a randomized GERCOR study. J Clin Oncol 2004; 22: 229–37.
2. de Gramont A., et al. Leucovorin and fluorouracil with or without oxaliplatin as first – line treatment in advanced colorectal cancer. J Clin Oncol 2000; 18: 2938–47.
3. Levi F., et al. Randomized, multicentre trial of chronotherapy with oxaliplatin, fluorouracil and folinic acid in metastatic colorectal cancer. The Lined 1997; 350: 681–86.
4. de Gramont A., et al. OPTIMOX study: FOLFOX7/LV5FU2 compared to FOLFOX4 in patients with advanced colorectal cancer. Proc Am Soc Clin Oncol 2003; 22: 3525.
5. Andre T et al. Oxaliplatin, fluorouracil and leucovorin as adjuvant treatment for colon cancer. N Engl J Med 2004; 350: 2343–51.
6. Study EFC 2917 Data on file, ASCO 1999; ab. 900.
7. de Gramont A, Figer A, Seymour M, Homerin M, LeBail N, Cassidy J, Boni C, Cortes-Funes H, Freyer G, Hendler D, Louvet C: A randomized trial of Leucovorin (LV) and 5-fluorouracil (5-FU) with or without oxaliplatin in advanced colorectal cancer (CRC). Proc ASCO 1998; 34: abstract no 985.
8. Misset J. L., et al. Multicentre phase II–III trial of oxaliplatin + cyclophosphamide versus cisplatin + cyclophosphamide in advanced chemotherapy – naive ovarian cancer: final results. Proc ASCO 2000; ab.1502.
9. Piccart M., et al. Oxaliplatin or Paclitaxel in patients with platinum-pretreated advanced ovarian cancer. J Clin Oncol 2000; 18: 1193–202.
10. Grufi C., et al. Oxaliplatin (L-OHP) activity in anthracycline-resistant metastatic breast cancer (MUC) patients. ASCO 1997; 16: 595.
11. Germann N., et al. Preliminary results on the activity of Oxaliplatin in refractory recurrent non-Hodgkin's lymphoma patients. Ann Oncol 1999; 10: 3574.



# **ЕВЕВЕ ОНКОЛОГИЯ**

**многосторонний подход**



## **АНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА**

- **Алексан® (Цитарабин)**
- **Доксорубицин “Эбеве”**
- **Кальциумфолинат “Эбеве”**
- **Карбоплатин “Эбеве”**
- **Метотрексат “Эбеве”**
- **Оксалиплатин “Эбеве”**
- **Паклитаксел “Эбеве”**
- **Цисплатин “Эбеве”**
- **Эпирубицин “Эбеве”**
- **Этопозид “Эбеве”**
- **5-Фторурацил “Эбеве”**

## **АНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ**

- **Тамоксифен “Эбеве”**



Московское представительство  
127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1  
Тел./факс: (495) 933-87-02/933-87-15  
e-mail: info@ebewe.ru