

Слюнные железы (ICD-O C07, C08)

Правила классификации

Классификация применима только для рака больших слюнных желез: околоушной (C07.9), подчелюстной (C08.0), подъязычной (C08.1). Опухоли, возникающие в малых слюнных железах (слизепродуцирующие железы, выстилающие мембрану верхней части дыхательного и пищеварительного трактов), не включаются в эту классификацию, а по своему анатомическому расположению классифицируются как рак губы. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

При оценке категорий T, N и M используются следующие методы:

T категории Физикальный осмотр и методы визуализации

N категории Физикальный осмотр и методы визуализации

M категории Физикальный осмотр и методы визуализации

Анатомические области и части

- Околоушная железа (C07.9)
- Подчелюстная железа (C08.0)
- Подъязычная железа (C08.1)

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами являются шейные лимфатические узлы.

TNM Клиническая классификация

T — Первичная опухоль

TX Недостаточно данных для оценки первичной опухоли

TO Первичная опухоль не определяется

T1 Опухоль до 2 см в наибольшем измерении без экстрапаренхимального распространения*

T2 Опухоль до 4 см в наибольшем измерении без экстрапаренхимального распространения*

T3 Опухоль более 4 см и/или опухоль с экстрапаренхимальным распространением*

T4a Опухоль распространяется на кожу, нижнюю челюсть, слуховой проход или лицевой нерв

T4b Опухоль распространяется на основание черепа, крылья основной кости или оболочку сонной артерии

Примечание. *Экстрапаренхимальное распространение клинически и макроскопически проявляется инвазией кожи, мягких тканей, кости или нерва, за исключением описанного в T4a и T4b.

Только микроскопическое проявление инвазии не является обоснованием для определения экстрапаренхимального распространения в классификации.

N — Регионарные лимфатические узлы

См. описание на с. 24.

M — Отдаленные метастазы

См. описание на с. 24.

pTNM Патологоанатомическая классификация

См. описание на с. 25.

G Гистопатологическая дифференцировка

См. описание на с. 20-21.

Группировка по стадиям

Стадия I	T1	N0	M0
Стадия II	T2	N0	M0
Стадия III	T3	N0	M0
	T1, T2, T3	N1	M0
Стадия IVA	T1, T2, T3	N2	M0
	T4a	N0, N1, N2	M0
Стадия IVB	T4b	Любая N	M0
	Любая T	N3	M0
Стадия IVC	Любая T	Любая N	M1

Резюме

Слюнные железы	
T1	≤2 см, без экстрапаренхимального распространения
T2	<4 см, без экстрапаренхимального распространения
T3	>4 см или экстрапаренхимальное распространение
T4a	Кожа, нижняя челюсть, слуховой канал, лицевой нерв
T4b	Основание черепа, крылья основной кости, сонная артерия
N1	Одиночный на стороне поражения до ≤3 см
N2	(а) Одиночный на стороне поражения <6 см
	(б) Множественные на стороне поражения ≤6 см
	(с) С обеих сторон, на противоположной стороне ≤6 см
N3	>6 см