

Тонкая кишка (ICD-O C17)

Правила классификации

Классификация применима только для рака. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

При оценке T, N и M категорий используются следующие методы:

- T категории* Физикальный осмотр, методы визуализации, эндоскопия и/или хирургическое исследование
- N категории* Физикальный осмотр, методы визуализации и/или хирургическое исследование
- M категории* Физикальный осмотр, методы визуализации и/или хирургическое исследование

Анатомические области и части

1. Двенадцатиперстная кишка (C 17.0)
2. Тощая кишка (C17.1)
3. Подвздошная кишка (C 17.2) (исключая илеоцекальный клапан C 18.0)

Примечание. Эта классификация не применима для рака Фатерова соска.

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами для двенадцатиперстной кишки являются панкреатодуоденальные,

ТОНКАЯ КИШКА

67

пилорические, печеночные (узлы около общего желчного протока, желчного пузыря, ворот печени) и верхние брыжеечные узлы. Регионарными лимфатическими узлами для тощей и подвздошной кишки являются брыжеечные, включая верхние брыжеечные лимфатические узлы, и для терминального отдела — подвздошно-ободочные узлы, включая задние лимфатические узлы около слепой кишки.

TNM Клиническая классификация

T — Первичная опухоль

- TX Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
- T0 Первичная опухоль не определяется
- Tis Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ)
- T1 Опухоль инфильтрирует стенку кишки до подслизистой
- T2 Опухоль инфильтрирует мышечную оболочку стенки кишки
- T3 Опухоль инфильтрирует субсерозу или ткань неперитонизированных участков околмышечных тканей (брыжейки или забрюшинного пространства*) с распространением не более 2 см
- T4 Опухоль прорастает висцеральную брюшину или непосредственно распространяется на соседние органы и структуры (включая другие петли тонкой кишки, брыжейку, забрюшинное пространство более чем на 2 см, брюшную стенку по серозной оболочке, для двенадцатиперстной кишки прорастание в поджелудочную железу)

Примечание. *Неперитонизированными околмышечными тканями являются: для тощей и подвздошной кишки часть брыжейки, для двенадцатиперстной — зоны, где отсутствует сероза, часть забрюшинного пространства.

N — Регионарные лимфатические узлы

- NX** Нет достаточных данных для оценки регионарных лимфатических узлов
- N0** Нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов
- N1** Метастазы в регионарных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

См. описание на с. 24.

pTNM Патологоанатомическая классификация

pT, pN и pM категории соответствуют T, N и M категориям.

pN0 При гистологическом анализе материала регионарной лимфаденэктомии должно исследоваться не менее 6 лимфатических узлов. Если лимфатические узлы негативны, но исследовано менее 6, классифицируются pN0.

G Гистопатологическая дифференцировка

См. описание на с. 55.

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	M0
Стадия I	T1	N0	M0
	T2	N0	M0
Стадия II	T3, T4	N0	M0
Стадия III	Любая T	N1	M0
Стадия IV	Любая T	Любая N	M1

Резюме

Тонкая кишка	
T1	Собственная пластинка, подслизистая
T2	Мышечный слой
T3	Субсероза, перитонизированные околомышечные ткани (брыжейка или забрюшинное пространство <2 см)
T4	Висцеральная брюшина, другие органы/структуры (включая брыжейку, забрюшинное пространство >2 см)
N1	Регионарные