

Анальный канал (ICD-O C21.1)

Анальный канал простирается от прямой кишки до перианальной кожи (до места соединения с участком кожи, покрытым волосами), образован слизистой оболочкой, покрывающей внутренний сфинктер, включая переходный эпителий и зубчатую линию. Опухоли анального кольца (ICD-0 C44.5) классифицируются как опухоли кожи.

Правила классификации

Классификация применима только для рака. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

При оценке T, N и M категорий используются следующие методы:

- T категории* Физикальный осмотр, методы визуализации, эндоскопия и/или хирургическое исследование
- N категории* Физикальный осмотр и методы визуализации и/или хирургическое исследование
- M категории* Физикальный осмотр и методы визуализации и/или хирургическое исследование

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами являются околопрямокишечные, внутренние подвздошные и паховые лимфатические узлы.

TNM Клиническая классификация**T — Первичная опухоль**

- TX Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
 T0 Первичная опухоль не определяется
 Tis Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ)
 T1 Опухоль до 2 см в наибольшем измерении
 T2 Опухоль до 5 см в наибольшем измерении
 T2 Опухоль более 5 см в наибольшем измерении
 T4 Опухоль любого размера, прорастающая соседние органы: влагалище, мочеиспускательный канал, мочевого пузырь

Примечание: Распространение на стенку прямой кишки, кожу, подкожную клетчатку или мышечный сфинктер не классифицируется как T4

N — Регионарные лимфатические узлы

- NX Недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов
 N0 Нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов
 N1 Метастазы в околопрямокишечных лимфатических(ом) узлах(е)
 N2 Метастазы в подвздошных или паховых лимфатических(ом) узлах(е)
 N3 Метастазы в околопрямокишечных и паховых лимфатических узлах и/или в подвздошных и/или паховых с обеих сторон

M — Отдаленные метастазы

См. описание на с. 24.

pTNM Патологоанатомическая классификация

pT, pN и pM категории соответствуют T, N и M категориям.

pNO При гистологическом анализе материала околопрямокишечно-тазовой лимфаденэктомии необходимо исследование не менее 12 лимфатических узлов, при гистологическом анализе материала паховой лимфаденэктомии не менее 6 лимфатических узлов. Если лимфатические узлы негативны, но число исследованных меньше требуемого, то классифицируется pNO.

G Гистопатологическая дифференцировка

См. описание на с. 55.

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	MO
Стадия I	T1	N0	MO
Стадия II	T2	N0	MO
		N0	MO
Стадия IIIA	T3, T2, T3	N1	MO
	T4	N0	MO
Стадия IIIB	T4	N1	MO
	Любая T	N2, N3	MO
Стадия IV	Любая T	Любая N	M1

Резюме

Анальный канал	
T1	<2 см
T2	>2 до 5 см
T3	>5 см
T4	Прилежащие органы
N1	Околопрямокишечные
N2	Внутренние подвздошные (паховые с одной стороны)
N3	Околопрямокишечные и паховые, внутренние подвздошные (паховые с обеих сторон)