

ОПУХОЛИ КОЖИ

Классификация применима для рака кожи, исключая веко, вульву и половой член, а также злокачественные меланомы кожи.

Анатомические области и части

В этот раздел, согласно топографической рубрикации ICD-0, включаются:

- Губа (исключая красную кайму) (C44.0)
- Веко (C44.1)
- Наружное ухо (C44.2)
- Другие части лица (C44.3)
- Скальп и шея (C44.4)
- Туловище, включая анальный край и перианальную кожу (C44.5)
- Предплечье и плечо (C44.6)
- Голень и бедро (C44.7)
- Вульва (C51.0)
- Половой член (C60.9)
- Мошонка (C63.2)

Каждую опухоль описывают с учетом следующих критериев:

- Правила классификации и методы оценки T, N и M категорий

- Регионарные лимфатические узлы
- TNM Клиническая классификация
- pTNM Патологоанатомическая классификация
- G Гистопатологическая дифференцировка (для рака)
- Группировка по стадиям
- Резюме

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами являются узлы, соответствующие локализации первичной опухоли.

Односторонние опухоли

- **Голова, шея:** Преаурикулярные на стороне поражения, подчелюстные, шейные и надключичные лимфатические узлы
- **Грудная клетка:** Подмышечные лимфатические узлы на стороне поражения
- **Рука:** Лимфатические узлы в локтевой ямке и подмышечные на стороне поражения
- **Брюшная стенка, поясница, ягодицы:** Паховые лимфатические узлы на стороне поражения
- **Нога:** Подколенные и паховые лимфатические узлы на стороне поражения
- **Анальный край и перинальная кожа:** Паховые лимфатические узлы на стороне поражения

Опухоли в пограничных зонах, между и выше

Лимфатические узлы, принадлежащие к областям с обеих сторон пограничной зоны, считаются регионарными лимфатическими узлами. Пограничными зонами считаются следующие 4-сантиметровые полосы:

| Между | Вдоль |
|---|---|
| Правое/левое | Средняя линия |
| Голова и шея/грудная клетка | Ключично-акромиальная—верхний край лопатки |
| Грудная клетка/рука | Плечо—подмышка—плечо |
| Грудная клетка/брюшная стенка, поясница и ягодицы | <i>Спереди:</i> середина между пупком и реберной дугой <i>Сзади:</i> нижняя граница грудного отдела позвоночника |
| Брюшная стенка, поясница и ягодицы/нога | Пахово-вертикально-ягодичная складка |

Метастазы в любых других лимфатических узлах, не относящихся к указанным группам, обозначаются как M1.

Отдаленные метастазы

Категории M1 и pM 1 могут быть дополнены в зависимости от локализации отдаленных метастазов:

| | | | |
|--------------------|-----|--------------|-----|
| Легкое | PUL | Костный мозг | MAR |
| Кости | OSS | Плевра | PLE |
| Печень | HEP | Брюшина | PER |
| Головной мозг | BRA | Надпочечники | ADR |
| Лимфатические узлы | LYM | Кожа | SKI |
| Другие | OTH | | |

R Классификация

Наличие или отсутствие резидуальных опухолей после лечения обозначается символом R. Определение резидуальных опухолей возможно при всех опухолях кожи:

- RX Недостаточно данных для определения резидуальной опухоли
- R0 Резидуальная опухоль отсутствует
- R1 Резидуальная опухоль определяется микроскопически
- R2 Резидуальная опухоль определяется макроскопически