

Определение категорий Т и М соответствует стадиям, применяемым FIGO, поэтому для сравнения приведены обе классификации.

Правила классификации

Классификация применима только для первичного рака. Опухоли других половых органов или экстрагенитальных локализаций, распространяющиеся на влагалище, сюда не включены. Опухоли, распространяющиеся на влагалищную часть шейки матки и достигающие области наружного отверстия шеечного канала, относятся к раку шейки матки. Опухоли, вовлекающие вульву, классифицируются как опухоли вульвы. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

При оценке категорий Т, N и М применяются следующие методы:

<i>Т категории</i>	Физикальный осмотр, эндоскопия и методы визуализации
<i>N категории</i>	Физикальный осмотр и методы визуализации
<i>М категории</i>	Физикальный осмотр и методы визуализации

Регионарные лимфатические узлы

FIGO стадии основаны на хирургическом стадировании, а TNM стадии на клиническом и патологоанатомическом. Регионарными для верхних двух третей вла-

галища являются тазовые лимфатические узлы, включая obturatorный, внутренние и наружные подвздошные, лимфатические узлы таза, NOS (четко не установлены), а для нижней трети — паховые и бедренные лимфатические узлы.

TNM Клиническая классификация

Т — Первичная опухоль

TNM	FIGO	
TX		Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
TO		Первичная опухоль не определяется
Tis	0	Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ)
T1	I	Опухоль ограничена влагалищем
T2	II	Опухоль вовлекает паравагинальные ткани, но не распространяется на стенки таза
T3	III	Опухоль распространяется на стенки таза
T4	IVA	Опухоль вовлекает слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки и/или распространяется за пределы таза
		Примечание. Наличие буллезного отека недостаточно для классификации опухоли как T4.
M1	IVB	Отдаленные метастазы

N — Регионарные лимфатические узлы

- NX Недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов
- N0 Нет признаков поражения метастазами регионарных лимфатических узлов
- N1 Метастазы в регионарных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

См. описание на с. 24.

pTNM Патологоанатомическая классификация

pT, pN и pM категории соответствуют T, N и M категориям.

- pNO** При гистологическом анализе материала паховой лимфаденэктомии должно быть исследовано не менее 6 лимфатических узлов; при тазовой лимфаденэктомии — не менее 10 лимфатических узлов. Если лимфатические узлы негативны, а исследовано меньше требуемого количества, классифицируется pNO.

G Гистопатологическая дифференцировка

См. описание на с. 146.

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	M0
Стадия I	T1	N0	M0

Стадия II	T2	N0	M0
Стадия III	T3 T1, T2, T3	N0 N1	M0 M0
Стадия IVA	T4	Любая N	M0
Стадия IVB	Любая T	Любая N	M1

Резюме

TNM	Влагалище	FIGO
T1	Стенка влагалища	I
T2	Паравагинальные ткани	II
T3	Распространение на стенки таза	III
T4	Поражена слизистая оболочка мочевого пузыря/прямой кишки, выход за пределы таза	IVA
N1	Регионарные	-
M1	Отдаленные метастазы	IVB