

Маточная труба (ICD-O C57.0)

Данная классификация рака маточной трубы основана на адаптированной Классификации FIGO 1992 г. Определение категорий Т, N и M соответствует стадиям FIGO, поэтому для сравнения приводятся обе классификации.

Правила классификации

Классификация применима только для рака. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

При оценке Т, N и M категорий используются следующие методы:

Т категории Физикальный осмотр, методы визуализации, лапароскопия и/или хирургические методы

N категории Физикальный осмотр, методы визуализации, лапароскопия и/или хирургические методы

M категории Физикальный осмотр, методы визуализации, лапароскопия и/или хирургические методы

Стадии FIGO классификации основываются на хирургической (TNM стадии основываются на клинической и/или паталогоанатомической классификации)

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами являются подчревные (запирательные), общие и наружные подвздошные, боковые крестцовые, парааортальные и паховые.

TNM Клиническая классификация

T — Первичная опухоль

TNM	FIGO	
TX		Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
T0 Tis	0	Первичная опухоль не определяется Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ)
T1	I	Опухоль ограничена маточной трубой(ами)
T1a	IA	Опухоль ограничена одной трубой, без прорастания серозной оболочки, без асцита
T1b	IB	Опухоль ограничена двумя трубами, без прорастания серозной оболочки, без асцита
T1c	IC	Опухоль ограничена одной или двумя трубами с проникновением в или через серозную оболочку или с наличием опухолевых клеток в асците или смыве из брюшной полости
T2	II	Опухоль вовлекает одну или обе трубы и распространяется на таз
T2a	IIA	Распространение и/или метастазы в матку и/или яичники
T2b	IIB	Распространение на другие структуры таза
T2c	IIC	Распространение на таз (2a или 2b) с наличием опухолевых клеток в асците или смыве из брюшной полости

TNM	FIGO	
T3 и/ или N1	III	Опухоль поражает одну или обе маточные трубы с имплантацией по брюшине вне таза и/или метастазами в регионарных лимфатических узлах
T3a	IIIA	Микроскопические метастазы по брюшине за пределами таза
T3б	IIIB	Макроскопические метастазы по брюшине за пределами таза до 2 см в наибольшем измерении и/или метастазы в регионарных лимфатических узлах
T3c и/ или N1	IIIC	Метастазы по брюшине более 2 см в наибольшем измерении и/или метастазы в регионарных лимфатических узлах
M1	IV	Отдаленные метастазы (исключая метастазы по брюшине)
Примечание. Метастазы з капсулу печени это T3/стадия III, в паренхиме печени M1/стадия IV. Плевральный выпот при положительной цитологии M1/стадия IV.		

N — Регионарные лимфатические узлы

NX Нет данных для оценки регионарных лимфатических узлов

N0 Нет метастазов в регионарных лимфатических узлах

N1 Метастазы в регионарных лимфатических узлах

M — Отдаленные метастазы

См. описание на с. 24.

pTNM Патологоанатомическая классификация

Категории pT, pN и pM соответствуют категориям T, N и M.

pNO При гистологическом анализе материала тазовой лимфаденэктомии должно быть исследовано не менее 10 лимфатических узлов. Если лимфатические узлы негативны, а количество исследованных меньше 10, классифицируется как pNO.

G Гистопатологическая дифференцировка

См. описание на с. 146.

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	M0
Стадия IA	T1a	N0	M0
Стадия IB	T1b	N0	M0
Стадия IC	T1c	N0	M0
Стадия IIA	T2a	N0	M0
Стадия IIB	T2b	N0	M0
Стадия IIC	T2c	N0	M0
Стадия IIIA	T3a	N0	M0
Стадия IIIB	T3b	N0	M0
Стадия IIIC	T3c	N0	M0
	Любая T	N1	M0
Стадия IV	Любая T	Любая N	M1

Резюме

TNM	Маточная труба	FIGO
T1	Ограничена трубой(ами)	I
T1a	Одна труба, сероза интактна	IA
T1b	Обе трубы, сероза интактна	IB
T1c	Проращение серозы, опухолевые клетки в асците или смыве	IC
T2	Распространение на таз	II
T2a	Матка и/или яичники	IIA
T2b	Другие структуры таза	IIB
T2c	Опухолевые клетки в асците или смыве	IIC
T3 и/или N1	Метастазы по брюшине за пределами таза	III
T3a	Микроскопические метастазы по брюшине	IIIA
T3b	Макроскопические метастазы по брюшине до 2 см	IIIB
T3c и/или N1	Метастазы по брюшине более 2 см и/или метастазы в регионарных лимфатических узлах	IIIC
M1	Отдаленные метастазы (исключая метастазы по брюшине)	IV