

Половой член (ICD-O C60)

Правила классификации

Классификация применима только для рака. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

Для оценки категорий T, N и M применяются следующие методы:

<i>T категории</i>	Физикальный осмотр и эндоскопия
<i>N категории</i>	Физикальный осмотр и методы визуализации
<i>M категории</i>	Физикальный осмотр и методы визуализации

Анатомические части

1. Крайняя плоть (C60.0)
2. Головка (C60.1)
3. Тело полового члена (C60.2)

Регионарные лимфатические узлы

Регионарными лимфатическими узлами являются поверхностные и глубокие паховые, а также тазовые лимфатические узлы.

TNM Клиническая классификация

T — Первичная опухоль

TX	Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
TO	Первичная опухоль не определяется
Tis	Преинвазивная карцинома (Carcinoma in situ)
Ta	Неинвазивная бородавчатая карцинома

- T1 Опухоль распространяется на субэпителиальную соединительную ткань
 T2 Опухоль распространяется на губчатое или пещеристое тело
 T3 Опухоль распространяется на уретру или предстательную железу
 T4 Опухоль распространяется на соседние структуры

N — Регионарные лимфатические узлы

- NX Недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов
 N0 Нет признаков поражения метастазами регионарных лимфатических узлов
 N1 Метастазы в одном поверхностном паховом лимфатическом узле
 N2 Метастазы в нескольких поверхностных паховых лимфатических узлах или метастазы с обеих сторон
 N3 Метастазы в глубоких паховых лимфатических узлах или в лимфатических узлах(е) таза с одной или обеих сторон

M — Отдаленные метастазы

- MX Недостаточно данных для определения отдаленных метастазов
 M0 Нет признаков отдаленных метастазов
 M1 Имеются отдаленные метастазы

pTNM Патологоанатомическая классификация

pT, pN и pM категории соответствуют T, N и M категориям.

G Гистопатологическая дифференцировка

- GX Степень дифференцировки не может быть установлена

- G1 Высокая степень дифференцировки
 G2 Средняя степень дифференцировки
 G3—4 Низкая степень дифференцировки или недифференцированные опухоли

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	M0
	Ta	N0	M0
Стадия I	T1	N0	M0
Стадия II	T1	N1	M0
	T2	N0, N1	M0
Стадия III	T1	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N0, N1, N2	M0
Стадия IV	T4	Любая N	M0
	Любая T	N3	M0
	Любая T	Любая N	M1

Резюме

Половой член	
Tis	In situ
Ta	Неинвазивная бородавчатая карцинома
T1	Субэпителиальная соединительная ткань
T2	Губчатое или пещеристое тело
T3	Уретра, предстательная железа
T4	Другие соседние структуры
N1	Один паховый поверхностный
N2	Множественные или с обеих сторон поверхностные паховые лимфатические узлы
N3	Глубокие паховые или тазовые