

## **Злокачественная меланома конъюнктивы (ICD-O C69.0)**

### **Правила классификации**

Классификация применима только для злокачественной меланомы. Должно быть гистологическое подтверждение диагноза.

Для оценки категорий Т, N и M применяются следующие методы:

<i>Т категории</i>	Физикальный осмотр
<i>N категории</i>	Физикальный осмотр
<i>M категории</i>	Физикальный осмотр и методы визуализации

### **Регионарные лимфатические узлы**

Регионарными лимфатическими узлами являются преаурикулярные, подчелюстные и шейные.

### **TNM Клиническая классификация**

#### **T — Первичная опухоль**

- TX Недостаточно данных для оценки первичной опухоли
- TO Первичная опухоль не определяется
- T1 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы
- T2 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы с распространением на роговицу
- T3 Опухоль(и) распространяется на свод конъюнктивы, конъюнктиву века или мясца
- T4 Опухоль(и) распространяется на веко, роговицу, орбиту, синусы или ЦНС

**N — Регионарные лимфатические узлы**

См. описание на с. 212.

**M — Отдаленные метастазы**

См. описание на с. 212.

**pTNM Патологоанатомическая классификация****pT — Первичная опухоль**

pTX Недостаточно данных для оценки первичной опухоли

pT0 Первичная опухоль не определяется

pT1 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы, ограниченная эпителием

pT2 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы не более 0,8 мм толщины с инвазией собственной субстанции (substantia propria)

pT3 Опухоль(и) бульбарной конъюнктивы более 0,8 мм толщины с инвазией собственной субстанции или с распространением на конъюнктиву века или мясца

pT4 Опухоль распространяется на веко, роговицу, орбиту, синусы или ЦНС

**pN — Регионарные лимфатические узлы**

pN категории соответствуют N категориям.

**pM — Отдаленные метастазы**

pM категории соответствуют M категориям.

**G Гистопатологическая дифференцировка**

GX Степень дифференцировки не может быть установлена

G0 Первичный приобретенный меланоз

G1 Меланома, развившаяся из невуса

G2 Меланома, развившаяся из первично приобретенного меланоза

G3 Меланома, развившаяся de novo

**Группировка по стадиям**

В настоящее время нет рекомендуемой группировки меланомы конъюнктивы по стадиям.

**Резюме**

<b>Злокачественная меланома конъюнктивы</b>			
T1	Бульварная конъюнктивит	pT1	Ограничена эпителием
T2	Бульбарная конъюнктивит с распространением на роговицу	pT2	Бульбарная конъюнктивит <0,8 мм толщины, распространяется на собственную субстанцию
T3	Свод, конъюнктивит века, мясца	pT3	pT2>0,8 мм толщины или распространена на конъюнктивит века или мясца
T4	Веко, роговица, орбита, синусы, ЦНС	pT4	T4
N1	Регионарные	pN1	Регионарные